

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet  
Institutt for fysikk

Faglig kontakt under eksamen:

Navn: Gudmann Slettemoen

Tlf.: 93419

### EKSAMEN I FAG 74181 - OPTIKK

Fredag 9. mai 1997

Tid: 0900-1300

Tillatte hjelpebidler:

Typegodkjent kalkulator, med tomt minne, i henhold til liste utarbeidet av NTNU

K. Rottman: Mathematische Formelsammlung

C. Barrett, T.M. Cronin: Mathematical Formulae


#### Oppgave 1

- a) Skriv ned (eller utled. om nødvendig) translasjonsmatrisen.
- b) Skriv ned (eller utled. om nødvendig) refraksjonsmatrisen.
- c) Skriv ned matrisen for avbildning med forstørrelse  $\beta$  i et optisk system med styrke  $P$ .
- d) Anta at systemmatrisen fra første optiske flate  $V$  til siste optiske flate  $V'$  er

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

Utlede uttrykk for avstanden  $h$  fra første hovedplan  $H$  til  $V$ , og for avstanden  $h'$  fra  $V'$  til andre hovedplan  $H'$ . Svarene skal uttrykkes ved A, B, C og D.

- e) Hva er systemmatrisen for systemet vist i figuren? (Anta at lyset går fra venstre mot høyre).





- f) Hva er styrken ( $P$ ) for systemet i e)?

### Oppgave 2

Anta tre plane bølger som vist i figuren (alle har samme amplitud  $A = 1$  og forplantes i xz-planet).


$$|\vec{k}_1| = |\vec{k}_2| = |\vec{k}_3|$$



- a) Hva er den totale feltamplituden  $U(x,y,z)$ ?  
 b) Hva er feltamplituden i planet  $z = 0$ ?  
 c) Hva er intensitetsmønsteret på en skjerm i planet  $z = 0$ ?


Oppgave 3

- a) Anta at en plan bølge,  $A \exp(ikz)$ , belyser et objekt med objektfunksjon  $t(x,y)$ . Utled uttrykket for Fraunhoferdiffraksjon fra det oppgitte Fresnels diffraksjonsintegral. Både  $U(x,y,z)$  og  $I(x,y,z)$  skal gis.
- b) Anta at en plan bølge,  $A \exp(ikz)$ , belyser objektet med objektfunksjon  $t(x,y) = t(x)$  som vist i figuren.



Beregn intensitetsmønsteret  $I(x,y,z)$  for Fraunhoferdiffraksjon.

- c) Hvilke betingelser må være oppfylt for at resultatet i b) skal være en god tilnærming til det virkelige intensitetsmønsteret?
- d) Hva skjer med resultatet i b) dersom belysningsbølgen faller inn på skrå i xz-planet med innfallsvinkel  $\theta$  (med z-aksen)?
- e) Anta at et objekt med objektfunksjon  $t(x,y)$  nå brukes i det koherente optiske avbildningssystemet vist i neste figur. Systemets fokallengde er  $f = 10$  cm og objektet er plassert i en avstand  $s = 20$  cm foran første hovedplan  $H$ . Den koherente punktkilden emitterer kulebølger og er plassert i en avstand  $d = 50$  cm foran  $H$ . Hvor i billedrommet finner vi fourierplanet?



Oppgitt

Fresnels diffraksjons integral:

$$U(x, y, z) = \frac{1}{i\lambda z} e^{ik\left[z + \frac{1}{2z}(x^2 + y^2)\right]} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(x', y', 0) e^{-i\frac{k}{z}(xx' + yy')} e^{\frac{ik}{2z}(x'^2 + y'^2)} dx' dy'$$

Den todimensjonale fouriertransformasjonen av en funksjon  $t(x, y)$  er definert som

$$T(k_x, k_y) = \mathcal{F}\{t(x, y)\} = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} t(x, y) e^{-i(k_x x + k_y y)} dx dy.$$

Den inverse transformasjonen er gitt av integralet:

$$t(x, y) = \mathcal{F}^{-1}\{T(k_x, k_y)\} = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} T(k_x, k_y) e^{i(k_x x + k_y y)} dk_x dk_y.$$

To versjoner av konvolusjonsteoremet:

$$\begin{aligned} T_1(k_x, k_y) * T_2(k_x, k_y) &= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} T_1(k'_x, k'_y) T_2(k_x - k'_x, k_y - k'_y) dk'_x dk'_y \\ &= \mathcal{F}\{t_1(x, y) t_2(x, y)\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_1(k_x, k_y) T_2(k_x, k_y) &= \mathcal{F}\{t_1(x, y) * t_2(x, y)\} \\ &= \mathcal{F}\left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} t_1(x', y') t_2(x - x', y - y') dx' dy' \right\} \end{aligned}$$