

Mandag 06.02.06

Beregning av \mathbf{E} fra V

[FGT 24.4; YF 23.5; TM 23.3; AF 21.10; LHL 19.9; DJG 2.3.1, 1.2.2]

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

Gradientoperatoren ∇ :

$$\begin{aligned}\nabla V &= \frac{\partial V}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{z} \quad (\text{kartesiske koordinater}) \\ &= \frac{\partial V}{\partial r} \hat{r} + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \hat{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \phi} \hat{\phi} \quad (\text{kulekoordinater})\end{aligned}$$

(NB: Det er *ikke* meningen at du skal gå rundt og huske på hvordan gradientoperatoren ser ut i kulekoordinater. Den vil bli oppgitt dersom det f.eks. skulle bli bruk for den til eksamen.) Hvis vi har kulesymmetri (dvs \mathbf{E} og V kun avhengig av r , ikke av vinklene θ og ϕ):

$$\mathbf{E} = E(r) \hat{r} = -\frac{\partial V}{\partial r} \hat{r}$$

Betydning av gradientoperatoren

Vektoren ∇V peker i den retningen der V øker raskest, dvs i den retningen der den *retningsderiverte* til V er størst. Etersom $\mathbf{E} = -\nabla V$, betyr det at det elektriske feltet peker i den retningen der V *avtar* raskest.

Eksempel: Dersom en punktladning q plasseres et sted der $\nabla V = 0$, blir den ikke utsatt for noen elektrisk kraft, for da er $\mathbf{F} = q\mathbf{E} = -q\nabla V = 0$.

Oppsummering til nå, og møte med Maxwell-ligning nr 1

Coulombs lov (empirisk lov for kraft mellom to ladninger q og q' i innbyrdes avstand r):

$$\mathbf{F} = \frac{qq'}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

Elektrisk felt fra punktladning q (følger av definisjonen “kraft pr ladningsenhet”):

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{F}}{q'} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

Konservativ kraft:

$$\int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l}$$

er uavhengig av integrasjonsveien, dvs veien mellom punktene A og B . Dermed:

$$\oint \mathbf{F} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

(dvs når vi integrerer rundt en *lukket* kurve)

Med definisjonen av \mathbf{E} følger det da at det elektrostatiske feltet også er konservativt, dvs:

$$\int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

er uavhengig av integrasjonsveien, og dermed

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

Dette er en av *Maxwells ligninger* (vel å merke, for statiske felt, dvs felt som ikke endrer seg med tiden).

Et konservativt vektorfelt kan alltid avledes fra et skalart *potensial*:

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

Potensialforskjellen mellom to punkter A og B kan beregnes dersom vi kjenner det elektriske feltet i området mellom A og B :

$$\Delta V = V_B - V_A = - \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

Superposisjonsprinsippet gjelder for elektrisk kraft \mathbf{F} (eksperimentelt resultat):

$$\mathbf{F}_i = \sum_{j=1}^n \mathbf{F}_{ij}$$

= kraft på ladning q_i fra ladninger q_j ($j = 1, 2, \dots, n$)

Da følger det at superposisjonsprinsippet også gjelder for elektrisk felt \mathbf{E} ,

$$\mathbf{E} = \sum_{j=1}^n \mathbf{E}_j$$

og for elektrisk potensial V ,

$$V = \sum_{j=1}^n V_j$$


Her er \mathbf{E}_j og V_j bidrag til henholdsvis felt og potensial fra ladning nummer j .

Elektrisk fluks

[FGT 23.1; YF 22.1; TM 22.2; AF 25.3; LHL 19.7; DJG 2.2.1]

$$\phi = \int_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$$

Noen ganger skriver vi ϕ_E for å presisere at det er snakk om *elektrisk* fluks. Vi har tidligere definert elektriske feltlinjer slik at den elektriske feltstyrken $E = |\mathbf{E}|$ skulle være proporsjonal med tettheten av feltlinjer, eller antall feltlinjer pr flateenhet. Av ovenstående definisjon av elektrisk fluks ϕ kan vi da slutte at ϕ representerer antall feltlinjer som krysser flaten S . Følgende figur illustrerer hva dette går ut på:



Flaten S er en vilkårlig “tenkt” eller “valgt” flate i rommet. Det elektriske feltet “eksisterer” i området der flaten S er “plassert”. (\mathbf{E} kan være null eller forskjellig fra null.) Flaten S tenkes så delt inn i små flateelementer $d\mathbf{A} = \hat{n}dA$, med areal dA og orientering i rommet spesifisert ved *flatenormalen* \hat{n} . Fluksen $d\phi$ gjennom flaten dA er da lik $\mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$. Den totale fluksen gjennom hele flaten S får vi ved å integrere opp bidragene $d\phi$, altså ligningen over.

Merk at fluksen er en *skalar* størrelse. Den kan imidlertid være positiv eller negativ, avhengig av om vinkelen mellom vektorene \mathbf{E} og $d\mathbf{A}$ er mindre eller større enn 90 grader.

En *lukket flate* S er en flate som omslutter et veldefinert volum V , f.eks. et kuleskall, et peanøttskall e.l. Den elektriske fluksen gjennom en lukket flate skriver vi slik (jfr. notasjonen for veiintegral rundt lukket kurve):

$$\phi_c = \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A}$$

Indeksen c står for “closed”. Den er forsåvidt unødvendig så lenge vi skriver ned integralet. Ringen på integrasjonssymbolet er tilstrekkelig for å understreke at det er snakk om en lukket flate.

Med en lukket flate kan vi gjøre unna “fortegnsproblemet” en gang for alle: Vi velger *positiv* retning på $d\mathbf{A}$ *ut av* flaten.

Dermed kan vi konkludere med at

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} > 0 &\Rightarrow \text{fluks ut gjennom flaten} \\ \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} < 0 &\Rightarrow \text{fluks inn gjennom flaten} \end{aligned}$$

Dessuten:

$$\phi_c > 0 \Rightarrow \text{netto fluks ut gjennom flaten}$$

$$\phi_c < 0 \Rightarrow \text{netto fluks inn gjennom flaten}$$

For en *ikke lukket* flate S har vi ingen tilsvarende mulighet for å velge positiv retning på $d\mathbf{A}$. Flaten har to sider, og ingen av disse kan sies å være mer “inne” eller “ute” i forhold til den andre. I enkelte tilfeller velger vi imidlertid en positiv retning på (den lukkede!) kurven (linjen) som går rundt kanten av S . Da definerer vi positiv retning på $d\mathbf{A}$ ved hjelp av *høyrehåndsregelen*: La høyrehåndas fire øvrige fingre peke i positiv retning for flatens omsluttede kurve. Da peker tommelen i positiv retning for $d\mathbf{A}$.

Gauss' lov

[FGT 23.2; YF 22.3; TM 22.2, 22.6; AF 25.4; LHL 19.7; DJG 2.2.1]

Gauss' lov (på såkalt integralform; senere i kurset, hvis vi får tid, skal vi se at vi også har en versjon av Gauss' lov på såkalt differensialform):

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0}$$

Her er integralet på venstre side av ligningen et *flateintegral* over en *lukket* flate S , mens q_{in} er total (netto) ladning innenfor den lukkede flaten (“gaussflaten”).

Gauss' lov er en av *Maxwells ligninger*. (Vi konsentrerer oss fremdeles om *elektrostatikk* en god stund framover, men faktisk er det slik at Gauss' lov også gjelder selv om \mathbf{E} skulle finne på å variere med tiden.)


Innholdet i ligningen kan formuleres slik: Netto antall feltlinjer ut av et volum, dvs ut gjennom den lukkede flaten som avgrensner dette volumet, er bestemt av, og direkte proporsjonal med netto ladning inne i volumet, dvs innenfor den lukkede flaten.

Gauss' lov følger direkte av Coulombs lov, og representerer således ingen ny fysikk.

I forbindelse med beviset for Gauss' lov fikk vi bruk for det vi kalte en *romvinkel* Ω . På samme måte som en liten sektor i et plan utspenner en *vinkel* $d\phi$ vil en liten kjegle i rommet utspenne en *romvinkel* $d\Omega$. Videre: På samme måte som at buelengden dl i avstand r fra “sentrum” da blir $dl = r d\phi$ blir arealet dA_r av flaten som står normalt på \mathbf{r} og som avgrenses av den lille kjeglen da lik $dA_r = r^2 d\Omega$.

I planet:

$$dl = r d\phi$$



I rommet:

$$dA_r = r^2 d\Omega$$



Lar vi sektoren i planet utspenne en hel omdreining, tilsvarer det en vinkel

$$\oint d\phi = \int_0^{2\pi} d\phi = 2\pi$$

Tilsvarende: Lar vi kjeglen i rommet utspenne en hel kuleflate, tilsvarer det en romvinkel

$$\oint d\Omega = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \sin \theta d\theta = 4\pi$$

(Her har vi brukt kulekoordinater, der $dA_r = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$ (se øving 4!), slik at $d\Omega = \sin \theta d\theta d\phi$.)