

Løsningsforslag til øving 2

Veiledning uke 3

Oppgave 1

a) C


Elektroner har *negativ* ladning. Et *overskudd* på  $N$  elektroner innebærer derfor en netto *negativ* ladning:

$$Q = -Ne = -5 \cdot 10^{13} \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C} = -8 \cdot 10^{-6} \text{ C} = -8 \mu\text{C}$$

Her står  $\mu$  for mikro, dvs  $1 \mu\text{C} = 10^{-6} \text{ C}$ .

b) A

Her er det egentlig nok å betrakte retningene på delkreftene som bidrar:




Med Pytagoras har vi at avstanden mellom de to positive ladningene er  $\sqrt{8}a$ . Ettersom coulombkraften er proporsjonal med  $1/r^2$ , må da kraften mellom de to positive bli halvparten så stor som kraften mellom den negative og den positive. Vektorsummen blir som vist i figuren, altså en total kraft  $\mathbf{F}$  med *negativ*  $x$ -komponent og *positiv*  $y$ -komponent.

Både  $x$ - og  $y$ -komponenten av kraften fra den positive ladningen bestemmes ved å gange kraftens størrelse med en faktor  $1/\sqrt{2}$ , dvs hhv  $\cos \pi/4$  og  $\sin \pi/4$ . Kraften mellom  $-q$  og  $q$  er lik  $F_0/4$  (i absoluttverdi), dvs at kraften mellom  $q$  og  $q$  er lik  $F_0/8$ . Total kraft, på vektorform, er dermed

$$\mathbf{F} = \frac{F_0}{4}\hat{y} - \frac{F_0}{8\sqrt{2}}\hat{y} - \frac{F_0}{8\sqrt{2}}\hat{x}$$

c) C

Totalt elektrisk felt i P er vektorsummen av bidragene fra de fire punktladningene. Konfigurasjonen i figur 3 gir den største feltstyrken. (Ingen feltbidrag har her komponent oppover.)



### Oppgave 2

Vi kan med god tilnærming regne oksygenmolekylene som punktformede legemer ettersom avstanden mellom dem ( $300 \text{ \AA}$ ) er mye større enn hvert enkelt molekyls utstrekning (av størrelsesorden  $1 - 2 \text{ \AA}$ ). Massen til et oksygenmolekyl er  $m(\text{O}_2) = (32 \text{ g/mol}) / (6.02 \cdot 10^{23} \text{ molekyler/mol}) = 5.32 \cdot 10^{-23} \text{ g/molekyl} = 5.32 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$ . Gravitasjonskraften mellom de to oksygenmolekylene blir da

$$F_g = G \frac{m(\text{O}_2)^2}{r^2} = 6.67 \cdot 10^{-11} \frac{\text{m}^3}{\text{kg} \cdot \text{s}^2} \cdot \frac{(5.32 \cdot 10^{-26})^2 \text{ kg}^2}{(300 \cdot 10^{-10})^2 \text{ m}^2} = 2.09 \cdot 10^{-46} \text{ N}$$

Gravitasjonskrefter er alltid *tiltrekkende*.

Med ett ekstra elektron har hvert ion  $\text{O}_2^-$  en ladning  $q = -e$ . Den elektriske kraften  $F_e$  mellom de to ionene blir dermed

$$F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{(1.6 \cdot 10^{-19})^2}{(300 \cdot 10^{-10})^2} = 2.56 \cdot 10^{-13} \text{ N}$$

Med ladningene i enheten C og avstanden i enheten m, samt SI-verdien  $9 \cdot 10^9$  for faktoren  $1/4\pi\epsilon_0$  er vi sikret at kraften kommer ut i enheten N.

Den elektriske kraften mellom to ladninger med *samme fortegn* er *frastøtende*.


Forholdet mellom de to kreftene er

$$\frac{F_e}{F_g} = \frac{2.56 \cdot 10^{-13}}{2.09 \cdot 10^{-46}} \sim 10^{33}$$


Dette betyr at gravitasjonskreftene mellom (“ikke altfor store”) ladete legemer som regel kan neglisjeres i forhold til den elektriske kraften. Dette forholdet er ikke avhengig av avstanden mellom de to ionene ettersom både  $F_e$  og  $F_g$  avhenger av innbyrdes avstand som  $1/r^2$ .

### Oppgave 3

a) På grunn av symmetrien i problemet er det vel innlysende at testladningen  $Q$  blir utsatt for null nettokraft, idet kreftene fra to og to ladninger kansellerer hverandre:



b) Vi fjerner en av ladningene, f.eks. den “øverste”:




Det er da umiddelbart klart at nettokraften på  $Q$  blir lik kraften fra den ladningen vi fjernet, med motsatt fortegn, altså  $-\mathbf{F}_2$ .

Vi har her brukt *superposisjonsprinsippet*. Matematisk kunne vi f.eks. formulere løsningen slik: La  $\sum_{(6)} \mathbf{F}_i$  angi nettokraften med alle 6 ladningene til stede og  $\sum_{(5)} \mathbf{F}_i$  nettokraften etter vi har fjernet ladningen som påvirket  $Q$  med kraften  $\mathbf{F}_2$ . Da er

$$\sum_{(5)} \mathbf{F}_i = \sum_{(6)} \mathbf{F}_i - \mathbf{F}_2 = 0 - \mathbf{F}_2 = -\mathbf{F}_2$$

c) Også med et odde antall  $q$ -ladninger, f.eks. 7, må nettokraften på testladningen  $Q$  i sentrum bli lik null. Anta at nettokraften *ikke* var null. En dreining av systemet på  $360/7^\circ$  i papirplanet ville da medføre at nettokraften endret retning. Men systemet er uendret som følge av en slik dreining, så kraften på  $Q$  kan heller ikke ha endret seg og må følgelig være null.

Hvis noen mot formodning ikke er overbevist, er det jo bare å regne ut nettokraften. Legg  $Q$  i origo og (f.eks.) den ene  $q$  på  $x$ -aksen:




Nettokraften på  $Q$  blir da:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{F} &= F_x \hat{x} + F_y \hat{y} \\
 &= F_0 (1 + 2 \cos 2\pi/7 + 2 \cos 4\pi/7 + 2 \cos 6\pi/7) \hat{x} + \\
 &\quad F_0 (0 + \sin 2\pi/7 + \sin(-2\pi/7) + \sin 4\pi/7 + \sin(-4\pi/7) + \sin 6\pi/7 + \sin(-6\pi/7)) \hat{y} \\
 &= F_0 (1 + 1.247 - 0.445 - 1.802) \hat{x} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Her har vi satt absoluttverdien av kraften mellom  $q$  og  $Q$  lik  $F_0$  og benyttet at  $\cos(-x) = \cos x$  og  $\sin(-x) = -\sin x$ .

#### Oppgave 4



a) Punktladningen  $q$  er i likevekt dersom kraften på den er lik null. Her virker det to krefter, en frastøtende fra  $3q$  og en tiltrekkende fra  $-q$ , og disse to kan bare kansellere hverandre dersom de har eksakt motsatt retning. Det er ikke mulig dersom  $q$  er plassert utenfor  $x$ -aksen, f.eks. som i figuren over. (Her er de to enkeltkomponentene av kraften angitt med stiplede piler og totalkraften med heltrukken pil.) Derfor må eventuelle likevektsposisjoner være på  $x$ -aksen.

b) Vi har fått oppgitt at det er *en* likevektsposisjon  $x_0$  for  $q$  på  $x$ -aksen. Vi kan ikke ha  $x_0$  mellom 0 og  $a$ , for på dette intervallet peker de to kraftkomponentene i samme retning. Vi kan heller ikke ha  $x_0$  til venstre for  $x = 0$ , for da er avstanden mellom  $q$  og  $3q$  alltid mindre enn avstanden mellom  $q$  og  $-q$ , og følgelig den frastøtende kraften  $3q^2/4\pi\epsilon_0 x_0^2$  alltid større enn den tiltrekkende kraften  $q^2/4\pi\epsilon_0 (a - x_0)^2$ . Altså må  $x_0 > a$ . Vi bestemmer  $x_0$  ved å sette total

kraft lik null:

$$\begin{aligned}0 &= \frac{3q^2}{4\pi\epsilon_0 x_0^2} \hat{x} - \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 (x_0 - a)^2} \hat{x} \\ \Rightarrow \frac{3}{x_0^2} &= \frac{1}{(x_0 - a)^2} \\ \Rightarrow 3x_0^2 - 6ax_0 + 3a^2 &= x_0^2 \\ \Rightarrow 2x_0^2 - 6ax_0 + 3a^2 &= 0 \\ \Rightarrow x_0 &= \frac{6a}{4} + \frac{1}{4} \sqrt{36a^2 - 24a^2} = \frac{3 + \sqrt{3}}{2} a \simeq 2.37a\end{aligned}$$

Da forutsetningen var  $x_0 > a$ , er løsningen med negativt fortegn foran kvadratroten ikke en aktuell løsning. (Den tilsvarer  $x \simeq 0.63a$ , hvor begge kraftkomponenter er like store og har *samme* retning.)

Stabiliteten av likevektsposisjonen  $x_0$  bestemmes kanskje enklest ved å se på nettokraften når  $x \gg x_0$ . Da “ser” punktladningen  $q$  tilnærmet en punktladning  $3q - q = 2q$  og må følgelig erfare en netto frastøtende kraft. Vi vet at kraften er null bare i  $x = x_0$ . Da må kraften peke mot høyre for alle  $x > x_0$ , også for en liten forflytning til høyre for  $x_0$ , mens den må peke mot venstre for en liten forflytning til venstre for  $x_0$ . Dermed er likevekten ustabil mhp en forflytning langs  $x$ -aksen.

Alternativt, med litt regning: La oss først forenkle notasjonen ved å innføre funksjonen  $f(x)$ :

$$\mathbf{F}(x) = F(x)\hat{x} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{3}{x^2} - \frac{1}{(x-a)^2} \right) \hat{x} \equiv \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} f(x)\hat{x}$$

Deretter bestemmer vi  $df/dx$  i  $x = x_0$ :

$$\left( \frac{df}{dx} \right)_{x=x_0} = -\frac{6}{x_0^3} + \frac{2}{(x_0 - a)^3} \simeq -\frac{6}{(2.37a)^3} + \frac{2}{(1.37a)^3} \simeq \frac{0.33}{a^3} > 0$$

Da  $f(x_0) = 0$  og  $f'(x_0) > 0$ , er likevekten ustabil.