

Løsningsforslag til øving 3

Oppgave 1

a) **C**

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} = m\mathbf{a}$$

Newtons 2. lov! Her er  $q = -e$ , så elektronets akselerasjon blir

$$\mathbf{a} = -\frac{e}{m}\mathbf{E}$$

altså mot venstre.

b) **C**

$$\Delta V = -\int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$$

dersom

$$d\mathbf{l} \perp \mathbf{E}$$

c) **B**

På samme måte som et legeme med null starthastighet faller i gravitasjonsfeltet fra f.eks. jorda, dvs beveger seg i retning lavere potensiell energi, vil en ladet partikkel med null starthastighet bevege seg i retning lavere potensiell energi i et elektrisk felt.

Matematisk: ( $\mathbf{F}$  = kraft,  $q$  = ladning ( $q < 0$ ),  $U$  = potensiell energi,  $V$  = potensial)

$$\mathbf{F} = q\mathbf{E} = -|q|\mathbf{E}$$

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

$$U = qV = -|q|V$$

$$\mathbf{F} = -\nabla U = -q\nabla V = |q|\nabla V$$

Partikkelens bevegelse må selvsagt bli i samme retning som  $\mathbf{F}$  (når starthastigheten er null), så vi ser at bevegelsen blir i motsatt retning av  $\mathbf{E}$ , og i retning høyere potensial  $V$ .

d) **B**

$$U = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} = e \cdot \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r} = e \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot 10^{10} = 14.4 \text{ eV}$$

e) **D**

Energibevarelse gir

$$\frac{1}{2}mv^2 = qV$$

Dvs: Akselerasjon av en partikkel med ladning  $q$  og masse  $m$  gjennom en potensialforskjell  $V$  resulterer i at reduksjon i potensiell energi,  $qV$ , gir økning i kinetisk energi,  $mv^2/2$ . Like stor hastighet for de to partiklene betyr da at

$$\frac{q_\alpha V_\alpha}{m_\alpha} = \frac{q_{\text{Be}} V_{\text{Be}}}{m_{\text{Be}}}$$

med andre ord

$$\frac{V_{\text{Be}}}{V_\alpha} = \frac{q_\alpha m_{\text{Be}}}{q_{\text{Be}} m_\alpha} = \frac{2 \cdot 9}{4 \cdot 4} = \frac{9}{8}$$

*Oppgave 2*

Potensialforskjellen  $\Delta V$  mellom to punkter er gitt ved

$$\Delta V = V_B - V_A = - \int_A^B \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l}$$

I denne oppgaven har vi et uniformt elektrisk felt  $\mathbf{E} = E_0 \hat{x}$ , så vi kan skrive

$$\Delta V = -E_0 \hat{x} \cdot \int_A^B d\mathbf{l}$$

der punktet  $A$  er origo,  $(0, 0)$  og  $B$  er de tre punktene gitt i oppgaveteksten. Vi får:

(i)

$$\int_A^B d\mathbf{l} = \int_{(0,0)}^{(a,0)} d\mathbf{l} = a \hat{x}$$

slik at

$$\Delta V = -E_0 \hat{x} \cdot a \hat{x} = -E_0 a$$

(ii)

$$\int_A^B d\mathbf{l} = \int_{(0,0)}^{(0,a)} d\mathbf{l} = a \hat{y}$$

slik at

$$\Delta V = -E_0 \hat{x} \cdot a \hat{y} = 0$$

(iii)

$$\int_A^B d\mathbf{l} = \int_{(0,0)}^{(a,a)} d\mathbf{l} = a \hat{x} + a \hat{y}$$



$$\begin{aligned}
&= r^2 \sin \theta \, d\theta \, d\phi \, \hat{r} \\
d\mathbf{A}_\theta &= (dr)(r \sin \theta \, d\phi) \hat{\theta} \\
&= r \, dr \sin \theta \, d\phi \, \hat{\theta} \\
d\mathbf{A}_\phi &= (dr)(r \, d\theta) \hat{\phi} \\
&= r \, dr \, d\theta \, \hat{\phi}
\end{aligned}$$

Merk at disse tre er *vektorer*, med absoluttverdi lik arealet av flatelementet (f.eks.  $dA_r$ ) og retning normalt på flaten (f.eks.  $\hat{r}$ ). Vi trenger både *størrelse* og *orientering* for å gi en presis beskrivelse av en flate!

Endelig ser vi at volumelementet må bli

$$dV = (dr)(r \, d\theta)(r \sin \theta \, d\phi) = r^2 \, dr \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

b) Volumet av ei kule med radius  $R$  finner vi ved å integrere volumelementet  $dV$  over alle verdier av  $\theta$  og  $\phi$  og  $r$  fra 0 til  $R$ :

$$\begin{aligned}
V(R) &= \int_{r < R} dV = \int_0^R r^2 \, dr \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \\
&= \frac{1}{3} R^3 \cdot 2 \cdot 2\pi = \frac{4\pi}{3} R^3
\end{aligned}$$

Merk at når vi integrerer over  $\phi$  fra 0 til  $2\pi$ , må vi integrere over  $\theta$  fra 0 til  $\pi$ , og ikke  $2\pi$ , for å dekke alle romvinkler (“retninger”) *en* gang, og ikke to.

Arealet av ei kuleflate med radius  $R$  finner vi ved å integrere flatelementet  $dA_r$  (altså absoluttverdien av  $d\mathbf{A}_r$ ) over alle verdier av  $\theta$  og  $\phi$  med  $r = R$ :

$$A(R) = \int_{r=R} dA_r = R^2 \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta \int_0^{2\pi} d\phi = R^2 \cdot 2 \cdot 2\pi = 4\pi R^2$$

c) Den oppgitte ladningstettheten er positiv (eller null) overalt inne i kula. Den vokser lineært med avstanden fra kulas sentrum. Videre fører leddet  $\cos^2 \theta$  til størst ladningstetthet på de to “polene” (dvs  $\theta = 0$  eller  $\theta = \pi$ ) og minst ladningstetthet (null) i ekvatorplanet (dvs  $\theta = \pi/2$ ). Et lite volumelement  $dV$  av kula inneholder en ladning

$$dq = \rho \, dV$$

Kulas totale ladning får vi ved å integrere  $dq$  over kulas volum. Vi bruker uttrykket for  $dV$  fra punkt a) og får:

$$\begin{aligned}
Q &= \int dq \\
&= \int_{r=0}^R \int_{\theta=0}^\pi \int_{\phi=0}^{2\pi} \rho_0 \frac{r}{R} \cos^2 \theta \, r^2 \, dr \sin \theta \, d\theta \, d\phi
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \rho_0 \left( \int_{r=0}^R \frac{r^3}{R} dr \right) \left( \int_{\theta=0}^{\pi} \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \right) \left( \int_{\phi=0}^{2\pi} d\phi \right) \\
&= \rho_0 \left|_0^R \frac{r^4}{4R} \right|_0^{\pi} \left( -\frac{1}{3} \cos^3 \theta \right) \left|_0^{2\pi} \phi \right. \\
&= \rho_0 \frac{R^3}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot 2\pi \\
&= \frac{\rho_0 \pi R^3}{3}
\end{aligned}$$

Har vi regnet riktig? Vel, vi har i hvert fall riktig dimensjon: Ladning pr volumenheter  $\rho_0$  ganget med en faktor  $R^3$ , som har dimensjon som et volum.

Med andre ord: Intet “mystisk” med slike flerdimensjonale integraler: Det er bare å integrere over hver integrasjonsvariabel for seg. Her var integranden hele tiden uavhengig av vinkelen  $\phi$ , så integralet over den gav bare en faktor  $2\pi$ . Videre var selvsagt  $\theta$ -avhengigheten i  $\rho$  i den siste oppgaven valgt med omhu, slik at vi fikk et enkelt løsbart integral over variabelen  $\theta$ .

Legg videre merke til at vi som regel ikke “gidder” å skrive  $\int \int \int dV$ , men simpelthen  $\int dV$ , selv om det altså er tre integrasjoner involvert. Det vil alltid gå fram av sammenhengen om det er en linje, en flate eller et volum vi skal integrere over.

#### Oppgave 4

a) Med vårt valg av polarvinkel  $\theta$  ser vi fra figuren at

$$\begin{aligned}
x &= r \sin \theta \\
z &= r \cos \theta \\
r &= \sqrt{x^2 + z^2}
\end{aligned}$$

b) Vi bruker superposisjonsprinsippet for å bestemme potensialet fra de to punktladningene. Med punktet  $(x, z)$  i en avstand  $r_1$  fra  $q$  og en avstand  $r_2$  fra  $-q$  får vi

$$\begin{aligned}
V(x, z) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_2} \\
&= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{\sqrt{x^2 + (z - a/2)^2}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + (z + a/2)^2}} \right)
\end{aligned}$$

Avstandene  $r_1$  og  $r_2$  uttrykt ved  $x$  og  $z$  ser vi direkte fra figuren.

Potensialet på  $x$ -aksen blir

$$V(x, 0) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2/4}} - \frac{1}{\sqrt{x^2 + a^2/4}} \right) = 0$$

Potensialet på  $z$ -aksen blir

$$V(0, z) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{|z - a/2|} - \frac{1}{|z + a/2|} \right)$$

Legg merke til at vi her må bruke absoluttverditegn hvis vi vil ha *ett* uttrykk som gjelder på *hele*  $z$ -aksen. Med  $z > a/2$ :

$$\frac{1}{|z - a/2|} - \frac{1}{|z + a/2|} = \frac{1}{z - a/2} - \frac{1}{z + a/2} = \frac{a}{z^2 - a^2/4}$$


Med  $z < -a/2$ :

$$\frac{1}{|z - a/2|} - \frac{1}{|z + a/2|} = -\frac{1}{z - a/2} + \frac{1}{z + a/2} = -\frac{a}{z^2 - a^2/4}$$


Med  $-a/2 < z < a/2$ :

$$\frac{1}{|z - a/2|} - \frac{1}{|z + a/2|} = -\frac{1}{z - a/2} - \frac{1}{z + a/2} = -\frac{2z}{z^2 - a^2/4} = \frac{2z}{a^2/4 - z^2}$$

Skisse av  $V(0, z)$ :



c) Vi bruker tipset gitt i oppgaveteksten, samt betraktning av følgende figur, og får:



$$\begin{aligned}
V(r, \theta) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \\
&= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{r_2 - r_1}{r_1 r_2} \\
&\simeq \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{a \cos \theta}{r^2} \\
&= \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \\
&= \frac{pr \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^3} \\
&= \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{4\pi\epsilon_0 r^3}
\end{aligned}$$

Vi kan alternativt gå litt saktere fram: Fra figuren ser vi at

$$\begin{aligned}
r_1 &\simeq r - \frac{a}{2} \cos \theta \\
r_2 &\simeq r + \frac{a}{2} \cos \theta
\end{aligned}$$

Når  $r \gg a$  kan vi rekkeutvikle både  $1/r_1$  og  $1/r_2$  omkring  $1/r$  og får:

$$\begin{aligned}
\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} &\simeq \frac{1}{r - \frac{a}{2} \cos \theta} - \frac{1}{r + \frac{a}{2} \cos \theta} \\
&= \frac{1}{r} \left[ \left( 1 - \frac{a \cos \theta}{2r} \right)^{-1} - \left( 1 + \frac{a \cos \theta}{2r} \right)^{-1} \right] \\
&\simeq \frac{1}{r} \left[ 1 + \frac{a \cos \theta}{2r} - 1 + \frac{a \cos \theta}{2r} \right] \\
&= \frac{a \cos \theta}{r^2}
\end{aligned}$$

Er det så *rimelig* at potensialet fra en elektrisk dipol faller av raskere enn potensialet fra en punktladning (dvs en elektrisk “monopol”)? Det er det, fordi dipolens negative og positive ladning bidrar med motsatt fortegn til det totale potensialet. Dermed vil bidragene til potensialet fra de to punktladningene delvis oppheve hverandre. (På  $x$ -aksen vil de to bidragene *eksakt* oppheve hverandre.)

Ekstranøtten (ikke så viktig, mest for “moro skyld”):

I første omgang kunne en kanskje tenke seg å fortsette rekkeutviklingen ovenfor, og ta med så mange ledd at vi får tak i dominerende korreksjon. Tar vi med ett ledd til, får vi ingenting nytt, i og med at det neste leddet vil opptre to ganger og med motsatt fortegn og dermed kansellere. Vi må ta med to ledd til:

$$\frac{1}{r} \left[ \left( 1 - \frac{a \cos \theta}{2r} \right)^{-1} - \left( 1 + \frac{a \cos \theta}{2r} \right)^{-1} \right]$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{r} \left[ 1 + \frac{a \cos \theta}{2r} + \left( \frac{a \cos \theta}{2r} \right)^2 + \left( \frac{a \cos \theta}{2r} \right)^3 + \dots - \left( 1 - \frac{a \cos \theta}{2r} + \left( \frac{a \cos \theta}{2r} \right)^2 - \left( \frac{a \cos \theta}{2r} \right)^3 + \dots \right) \right] \\
&= \frac{a \cos \theta}{r^2} - \frac{a^3 \cos^3 \theta}{4r^4} + \dots \\
&= \frac{a \cos \theta}{r^2} \left( 1 - \frac{a^2 \cos^2 \theta}{4r^2} + \dots \right)
\end{aligned}$$

Her brukte vi rekkeutviklingen  $(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots$  (som gjelder når  $|x| < 1$ ). Ikke noe dårlig forsøk dette, men det er en liten hake ved det hele: Utgangspunktet for hele rekkeutviklingen var i seg selv en tilnærming, nemlig

$$\begin{aligned}
r_1 &\simeq r - \frac{a}{2} \cos \theta \\
r_2 &\simeq r + \frac{a}{2} \cos \theta
\end{aligned}$$

Og feilen vi gjør i disse tilnærmelsene er av samme størrelsesorden som det korreksjonsleddet vi er på jakt etter!

Løsningen ligger i å gå helt tilbake til det eksakte uttrykket for  $V$ , med  $r_1$  og  $r_2$  uttrykt ved de kartesiske koordinatene  $x$  og  $z$ . Regningen er ikke direkte vanskelig, men såpass kronglete at jeg ikke tror jeg tar med noen flere detaljer her. Hvis jeg har regnet riktig, hvilket på ingen måte er sikkert, blir svaret

$$\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} = \frac{a \cos \theta}{r^2} \left[ 1 - \frac{3a^2}{8r^2} \left( 1 - \frac{5}{3} \cos^2 \theta \right) + \dots \right]$$

Her har vi tatt med alle korreksjoner som er en *størrelsesorden*  $a^2/r^2$  mindre enn det dominerende bidraget. Neste ledd i rekken vil bli ytterligere redusert, med en eller annen potens av den lille størrelsen  $a/r$ . Det første leddet som vi *ikke* tar med vil alltid være neglisjerbart i forhold til det siste leddet som vi tar med. (I vårt spesielle tilfelle, med unntak av retninger gitt ved  $\cos^2 \theta \simeq 3/5$ , der vi ser at første korreksjonsledd faktisk forsvinner.)