

Øving 4

Oppgave 1

a) Verifiser at en transversal bølge som forplanter seg langs x -aksen med utsving \mathbf{D} med komponentene D_z og D_y gitt ved

$$D_z = D_0 \cos(kx - \omega t) \quad (1)$$

og

$$D_y = D_0 \sin(kx - \omega t) \quad (2)$$

er sirkulærpolarisert. (Tips: Ta for deg $|\mathbf{D}|$, samt $\mathbf{D}(t)$ ved en fast posisjon x .)

b) Bestem om dreieretningen til \mathbf{D} er med eller mot klokka sett fra en observatør som ser *mot* bølgens forplantningsretning. (Dersom \mathbf{D} dreier med klokka, sies bølgen å være høyredreieende. Dersom \mathbf{D} dreier mot klokka, sies bølgen å være venstredreieende.)

c) Skriv opp ligninger tilsvarende ligning (1) og (2) for en bølge som har motsatt sirkulær polarisasjon av bølgen gitt ved lign. (1) og (2).

d) Tegn opp, i (y, z) -planet, kurven som (spissen av) \mathbf{D} følger dersom

$$\mathbf{D} = D_0 \sin(kx - \omega t)\hat{y} + D_0 \sin(kx - \omega t + \pi)\hat{z}$$

Gjør det samme når

$$\mathbf{D} = D_0 \sin(kx - \omega t)\hat{y} + 2D_0 \cos(kx - \omega t)\hat{z}$$

e) Vis at en lineærpolarisert bølge kan betraktes som en superposisjon av to sirkulærpolariserte bølger, med like stor amplitude, men med motsatt dreieretning, dvs en høyredreieende og en venstredreieende. (Tips: Dette burde gå relativt greit for polarisasjon langs y - eller langs z -aksen. Hvis du er riktig ambisiøs, viser du det samme for polarisasjon langs en vilkårlig retning i yz -planet.)

Oppgave 2

En gaussformet bølgepuls

$$\xi(x, t) = \xi_0 \exp \left[-\frac{(x - vt)^2}{a^2} \right]$$

vandrer med hastighet v langs ei (uendelig lang) fjær med massetetthet μ [kg/m] og elastisk modul K [N]. Størrelsen $\xi(x, t)$ representerer det longitudinale utsvinget (i forhold til likevekt) ved tidspunkt t for den biten av fjæra som har likevektsposisjon x .

a) Hvordan kan vi være sikre på at $\xi(x, t)$ virkelig er en mulig bølgepuls langs ei slik fjær? I hvilken retning propagerer bølgen?

b) Hvordan avhenger bølgehastigheten v av fjæras elastiske egenskaper (dvs K) og treghetsegenskaper (dvs μ)? Kontroller at uttrykket for v har riktig dimensjon. (Her er det kun meningen at du skal skrive ned uttrykket for v , ikke utlede det.)

c) Finn et uttrykk for (den totale) energien E assosiert med bølgepulsen. Kontroller at uttrykket for E har riktig dimensjon.

Tips: Ta utgangspunkt i at bølgens energi pr lengdeenhet er

$$\varepsilon(x, t) = \mu v^2 \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2$$

som utledet i forelesningene. Dermed er $\varepsilon(x, t) dx$ bølgens energiinnhold mellom x og $x + dx$. Det oppgis her følgende integral:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \beta^2 e^{-\beta^2} d\beta = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

d) Regn ut bølgens totale impuls p og sjekk at uttrykket tilfredsstillter sammenhengen $p = E/v$.

Tips: Ta utgangspunkt i at bølgens impuls pr lengdeenhet er

$$\pi(x, t) = \mu \left(1 - \frac{\partial \xi}{\partial x} \right) \frac{\partial \xi}{\partial t}$$

som utledet i forelesningene. Det oppgis her at

$$\int_{-\infty}^{\infty} \beta e^{-\beta^2} d\beta = 0$$

(som du kanskje ser, uten å løse integralet?)

Svar:

$$2c: E = \sqrt{\pi} \mu v^2 \xi_0^2 / \sqrt{2} a$$

Oppgave 3

Som nevnt i forelesningene, er det mulig å finne en eksakt løsning for longitudinale bølger på masse-fjær-transmisjonslinjen, uten å anta at bølgelengden λ er mye større enn avstanden d mellom to nabomasser. Ved å betrakte kreftene som virker på massen m med likevektsposisjon x , endte vi opp med følgende bevegelsesligning:

$$m \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = s [\xi(x+d) + \xi(x-d) - 2\xi(x)]$$

Her er $\xi(x \pm d)$ utsvinget til massen med likevektsposisjon $x \pm d$, mens s er fjærkonstanten (bruker her s siden vi trenger k for å angi bølgetallet).

La oss starte med å anta at en harmonisk bølge på formen

$$\xi(x, t) = \xi_0 \sin(kx - \omega t)$$

er løsning av bevegelsesligningen ovenfor. At harmoniske bølger faktisk *er* løsning av ligningen, skal vi straks se. Samtidig vil vi finne sammenhengen mellom ω og k .

a) Vis at $\xi(x+d) - \xi(x)$ og $\xi(x-d) - \xi(x)$ kan skrives som

$$\begin{aligned}\xi(x+d) - \xi(x) &= 2\xi_0 \cos(kx - \omega t + \frac{kd}{2}) \sin \frac{kd}{2} \\ \xi(x-d) - \xi(x) &= -2\xi_0 \cos(kx - \omega t - \frac{kd}{2}) \sin \frac{kd}{2}\end{aligned}$$

Tips: Benytt relasjonen

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

b) Vis deretter at bevegelsesligningen ovenfor resulterer i følgende sammenheng mellom vinkel-frekvensen ω og bølgetallet k (den såkalte *dispersjonsrelasjonen*):

$$\omega(k) = \sqrt{\frac{4s}{m} \sin^2 \left(\frac{kd}{2} \right)}$$

Tips: Benytt relasjonene

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

c) I forelesningene viste vi at for lange bølgelengder ($\lambda \gg d$, eventuelt $kd \ll 1$) blir bølgehastigheten konstant (dvs uavhengig av bølgelengden) og lik

$$v = \frac{\omega}{k} = \sqrt{\frac{sd^2}{m}}$$

Vis at den eksakte sammenhengen mellom ω og k fra punkt b gir samme resultat for v dersom $kd \ll 1$.

d) Et slik enkelt masse-fjær-system som vi har sett på her, er en ganske bra modell for forplantning av longitudinale bølger i krystallinske materialer. (Du kan lære mer om dette i emner som Faste stoffers fysikk senere i studiet.)

Bruk resultatene ovenfor til å vise at longitudinale bølger tilsvarende hørbar lyd vil forplante seg med konstant (dvs frekvensuavhengig) hastighet v gjennom en krystall, f.eks. et metall.

Tips: Anslå bølgelengden for hørbar lyd og sammenlign med en typisk avstand mellom naboatomer i en metallkrystall.