

FY6019 Moderne fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Våren 2017.
Øving 3. Innleveringsfrist: Søndag 12. mars kl 23.59.

Oppgave 1: Animasjon av ikke-stasjonære tilstander i endimensjonal potensialboks

I oppgave 1 i øving 2 studerte vi en ikke-stasjonær tilstand i en uendelig dyp potensialbrønn, satt sammen som en lineærkombinasjon av grunntilstanden og 1. eksiterte tilstand. Ved tidspunktet $t = 0$ var partikkelens bølgefunksjon

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{L}} \left(\sin \frac{\pi x}{L} + \sin \frac{2\pi x}{L} \right).$$

De stasjonære løsningene har tidsavhengig faktor $\exp(-iE_n t/\hbar)$. Her er Ψ en sum av to stasjonære løsninger, med hhv $n = 1$ og $n = 2$, som betyr at

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{L}} \left(\sin \frac{\pi x}{L} e^{-iE_1 t/\hbar} + \sin \frac{2\pi x}{L} e^{-iE_2 t/\hbar} \right),$$

med $E_n = n^2 \pi^2 \hbar^2 / 2mL^2$. Sannsynlighetstettheten er $\rho(x, t) = |\Psi(x, t)|^2 = \Psi^*(x, t)\Psi(x, t)$, og innsetting for $\Psi(x, t)$ gav

$$\rho(x, t) = \frac{1}{L} \left[\sin^2 \frac{\pi x}{L} + \sin^2 \frac{2\pi x}{L} + 2 \sin \frac{\pi x}{L} \sin \frac{2\pi x}{L} \cos \frac{3\pi^2 \hbar t}{2mL^2} \right].$$

a) Uttrykket for $\rho(x, t)$ viser at sannsynlighetstettheten på et gitt sted varierer harmonisk med periode T . Skriv ned uttrykket for T . Anta at $\rho(x, t)$ beskriver et elektron i en boks med bredde $L = 100 \text{ \AA}$. Hvor stor blir da perioden T ? Bruk enheten fs (femtosekunder).

b) Start opp *Spyder* og åpne programmet `oving3anim.py` (som er lagt ut under mappen Python). Programmet er ferdig skrevet og kan kjøres som det er. "Prøvekjør" programmet for å sjekke at det fungerer som det skal: Hos meg kommer det opp en figur, med horisontal og vertikal akse mellom 0 og 10^{-8} og mellom 0 og 1, og med en blå kurve med "tyngdepunkt" som svinger fram og tilbake mellom ca 0.3 og 0.7. Animasjonen avsluttes ved å stenge figuren med krysset oppe i høyre hjørne.

Det er nødvendig å forstå (deler av) hva programmet gjør, da vi skal gjøre noen små endringer nedenfor. Vi går derfor gjennom programmet med noen kontrollspørsmål.

- Hva blir gjort i linje 6 – 8?
- Hvilke verdier får energiene E_1 og E_2 i linje 9 og 10, og hva er enheten, når systemet er som beskrevet i a)?
- I linje 13 – 14 opprettes de romlige bølgefunksjonene $\psi_1(x)$ og $\psi_2(x)$. Er disse funksjonene normert?
- Linjene 26 – 32 utgjør funksjonen `animate(i)`, som kort fortalt returnerer grafen $y(x)$ for et gitt heltall i . I linje 37 – 38 sørges det for at $y(x)$ beregnes for i -verdier fra 1 til og med 368, der maksimalverdi for i angis med variabelen `frames`, og for hver i -verdi tegnes grafen $y(x)$ opp, med 10 ms, angitt med variabelen `interval`, mellom hvert bilde. En variabel kalt `repeat` har verdien `True` som *default* ("standard"), slik at serien på 368 bilder vises fram igjen og igjen, inntil figuren lukkes ved å klikke på krysset oppe i hjørnet. Hvor lang tid (klokketid, "real time") tar en serie på 368 bilder? Hvor lang tid tilsvarer dette "i elektronets verden"? Hvorfor har vi her valgt akkurat 368 bilder pr serie?
- I linje 30 utføres

$$y = \frac{1}{4} \left| \psi_1(x) e^{-iE_1 t/\hbar} + \psi_2(x) e^{-iE_2 t/\hbar} \right|^2.$$

Dersom du kjører programmet, ser du at dette gir y -verdier mellom 0 og ca 0.8. Dersom y skulle tilsvare en normert $\Psi(x, t)$, hvilken tallfaktor skulle vi da egentlig hatt her (dvs, i stedet for 1/4)?

c) Anta nå at elektronet befinner seg i en tilstand som er en lineærkombinasjon av grunntilstanden og 2. eksiterte tilstand, slik at bølgefunksjonen ved $t = 0$ er

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{L}} \left(\sin \frac{\pi x}{L} + \sin \frac{3\pi x}{L} \right).$$

Skriv ned $\Psi(x, t)$ for denne tilstanden, på tilsvarende vis som vi gjorde i innledningen til oppgaven, men med E_3 i stedet for E_2 . Skriv også ned $\rho(x, t)$ for denne tilstanden, og vis at sannsynlighetstettheten nå vil variere harmonisk med t , men med en periode som er redusert med en faktor 3/8 i forhold til perioden i punkt a) og b).

d) Foreta de nødvendige endringene i `oving3anim.py`, slik at programmet lager en animasjon av $\rho(x, t)$ for lineærkombinasjonen av grunntilstanden og 2. eksiterte tilstand. Pass på å endre verdien av variabelen `frames`, slik at en hel serie også nå tilsvarer en hel periode. Dersom du ønsker at klokketid for animasjon av en hel periode skal være like lang som i a) og b), hva slags verdi vil du da velge for variabelen `interval`?

Oppgave 2: Animasjon av bølgepakke sammensatt av mange stasjonære tilstander

Tilstandene i oppgave 1, satt sammen av kun to stasjonære tilstander, kan ikke sies å representere det vi tenker på som en "klassisk partikkel". Vi skal se at ved å lage en lineærkombinasjon av forholdsvis mange stasjonære tilstander, kan vi lage en bølgepakke som i en viss forstand oppfører seg som vi forventer av en klassisk partikkel.

Programmet `oving3anim2.py` lager en ikke-stasjonær tilstand (bølgepakke) som en lineærkombinasjon av 21 stasjonære tilstander, med energier fra og med $E_{110} = 110^2 \pi^2 \hbar^2 / 2mL^2$ til og med $E_{130} = 130^2 \pi^2 \hbar^2 / 2mL^2$. Med vektfunksjonen

$$W_n = \cos^2 \left(\frac{(n - 120)\pi}{22} \right)$$

gis de ulike stasjonære tilstandene vekt mellom 0 og 1, med vekt lik 1 for $n = 120$, og med symmetrisk avtagende vekt ned mot $n = 110$ og opp mot $n = 130$. Fasefaktoren

$$e^{-i(n-120)\pi/2}$$

sørger for at bølgepakken starter med sitt tyngdepunkt i $x = L/2$ ved $t = 0$, med (midlere) impuls og hastighet i positiv x -retning.

a) Kjør programmet slik det er lagt ut for å sjekke at det fungerer som det skal. Bølgepakken skal starte i retning mot høyre, kolliderer med høyre vegg, reflekteres, kolliderer med venstre vegg, og til slutt stanse med tyngdepunktet mellom $0.6L$ og $0.7L$.

b) Målt i elektrontid, hvor lenge varer hvert bilde her? Og hvor lenge varer hele animasjonen? (Her har vi satt `repeat=False`, slik at animasjonen stopper etter en serie.) Hvor langt har elektronet, representert ved bølgepakkens tyngdepunkt, totalt beveget seg på denne tiden? Hva blir elektronets midlere hastighet (i absoluttverdi) i løpet av hele animasjonen? Hvilken midlere impuls tilsvarer denne midlere hastigheten? Hvilken midlere energi ($E = p^2/2m$) tilsvarer denne midlere impulsen? Sammenlign denne midlere energien med energien til de stasjonære tilstandene som bølgepakken er satt sammen av. Kommenter resultatet.

c) Følg elektronets bevegelse over et ti ganger så langt tidsrom ved å øke verdien på variabelen frames. (Endre eventuelt interval fra 5 til for eksempel 2, hvis du synes filmen går for langsomt.) Legg merke til hvordan bølgepakkens romlige usikkerhet $\langle x \rangle$ etter hvert blir større og større. Dette fenomenet kaller vi *dispersjon*, og det skyldes at de ulike energiene (frekvensene) som bølgepakken er satt sammen av, ikke har samme hastighet. Andre eksempler på bølger som oppviser dispersjon er overflatebølger på vann og elektromagnetiske bølger i et dielektrikum. Sistnevnte eksempel gir opphav til ulik grad av brytning for ulike farger i det synlige spektret, og fenomener som for eksempel regnbuen.

Tips: Hvis du mener det er hensiktsmessig å inkludere "snapshots" fra de ulike animasjonene i besvarelsen din, er kanskje det enkleste å ta "print screen" underveis og kopiere dette inn i for eksempel programmet Paint med Ctrl+C. Der kan du lagre bildet i ønsket format.