

**TFY4115 Fysikk. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 2013.**  
**Løsningsforslag til øving 11.**

### Maxwells hastighetsfordeling

a) Med uavhengige hastighetskomponenter har vi ganske enkelt

$$F(v) = g(v_x) \cdot g(v_y) = \frac{B}{\pi} e^{-Bv^2},$$

der  $v^2 = v_x^2 + v_y^2$ .

Analogt det vi gjorde i forelesningene (for tredimensjonal hastighetsfordeling, se forelesningsnotatene) har vi nå, i to dimensjoner:

$$f(v)dv = \int_{\phi=0}^{2\pi} F(v)dv v d\phi = 2\pi v F(v)dv,$$

dvs

$$f(v) = 2\pi v F(v) = 2Bve^{-Bv^2}.$$

b) Se MATLAB-programmet `losning11.m` eller PYTHON-programmet `losning11.py`. (Noen variabelnavn er endret i forhold til `maxwell.m` og `maxwell.py`.) Jeg har valgt å tallfeste konstanten  $B$  med utgangspunkt i de eksperimentelle data,

$$B = B_{\text{exp}} = \frac{1}{\langle v^2 \rangle_{\text{exp}}} = 5.9394 \cdot 10^{-4} (\text{s/cm})^2,$$

siden

$$\langle v^2 \rangle = \langle v_x^2 \rangle + \langle v_y^2 \rangle = \frac{1}{B}.$$

c) Skivene har rms-fart 0.41 m/s, og massen er 0.032 kg. Dette tilsvarer en kinetisk energi pr "partikkel" av størrelsesorden 2.7 mJ. Setter vi dette lik termisk energi  $k_B T$  (med  $k_B =$  Boltzmanns konstant), finner vi en temperatur  $T \sim 2 \cdot 10^{20}$  K. Det er åpenbart ikke særlig meningsfylt å bruke ekvipartisjonsprinsippet for makroskopiske objekter som disse skivene.

d) Se `losning11.m` eller `losning11.py` for de to første kulepunktene. Det umiddelbare inntrykket av posisjonsfordelingen er vel at skivene er noenlunde jevnt fordelt over hele bildet, mens hastighetsfordelingen i større grad avtar "radielt" utover.