

Sammendrag, uke 14 (31. mars og 2. april)

Elementærpartiklers og atomers magnetiske dipolmoment [FGT 32.2; YF 29.9; AF 24.9; LHL 23.2; G 5.1.3]

Klassisk bilde av *atom*: Elektroner i (sirkulær) bane rundt atomkjernen.

Elektrisk strøm I i sirkelbanen for ladning q med hastighet v i sirkelbane med radius r :

$$I = \frac{q}{\tau} = \frac{q}{2\pi r/v} = \frac{qv}{2\pi r}$$

der τ = omløpstiden.

Omsluttet areal er:

$$A = \pi r^2$$


Magnetisk dipolmoment blir:

$$|\mathbf{m}| = IA = \frac{qv}{2\pi r} \cdot \pi r^2 = \frac{1}{2} qvr$$

Kan uttrykkes ved partikkelens *banedreieimpuls* $\mathbf{L}$:

$$\mathbf{L} = m\mathbf{r} \times \mathbf{v}$$

der m = partikkelens masse.



For sirkelbane er $\mathbf{r} \perp \mathbf{v}$ slik at

$$L = |\mathbf{L}| = mrv$$

Dermed:


$$|\mathbf{m}| = \frac{1}{2} qvr = \frac{q}{2m} L$$

På vektorform:

$$\mathbf{m} = \frac{q}{2m} \mathbf{L}$$

For elektron (med $q = -e$ og $m = m_e$):

$$\mathbf{m} = -\frac{e}{2m_e} \mathbf{L}$$



Elektroner (og protoner og nøytroner osv) har også “indre dreieimpuls”, såkalt *spinn* $\mathbf{S}$.
Klassisk bilde av spinn for elektron: Roterende ladet kule. Klassisk forventes bidrag

$$-\frac{e}{2m_e} \mathbf{S}$$


fra spinnbevegelsen til elektronets totale magnetiske dipolmoment.

Kvalitativt er disse klassiske bildene OK: Elementærpartikler som elektroner, protoner og nøytroner *har* magnetisk dipolmoment $\mathbf{m}$ som kan uttrykkes ved partikkelens totale dreieimpuls $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ = vektorsummen av banedreieimpulsen $\mathbf{L}$ og spinnet $\mathbf{S}$.

Kvantitativt bryter den klassiske modellen sammen: Det er helt nødvendig med en *kvantemekanisk* beskrivelse for å kunne regne ut de ulike partiklenes magnetiske dipolmoment, og dermed et atoms magnetiske dipolmoment $\mathbf{m}_A$.

Vi kan ikke gå inn på den kvantemekaniske beskrivelsen her. Vi har imidlertid kanskje klart å overbevise oss om at atomer faktisk er små elektriske strømsløyfer, og derfor små magnetiske dipoler. Med andre ord: Materien som vi omgir oss med består av mange små atomære magnetiske dipoler:

et stykke materie er bygd opp av atomer,
dvs av atomære magnetiske dipoler med
magnetisk dipolmoment $\mathbf{m}_j \quad j = 1 \dots n$



Magnetisk kraft på elektrisk strøm [FGT 29.4; YF 28.7; AF 24.9; LHL 23.2; G 5.1.3]

Rett leder, lengde L , strøm I :

$$\mathbf{F} = I \mathbf{L} \times \mathbf{B}$$

Generalisering: Leder med lengde L , strøm I , vilkårlig “form”:

$$\mathbf{F} = \int_L d\mathbf{F} = I \int_L d\mathbf{l} \times \mathbf{B}$$

Magnetisk kraft mellom parallelle strømførende ledere [FGT 30.1; YF 29.5; AF 24.14; LHL 23.5]

Kraft pr lengdeenhet mellom parallelle ledere med strøm hhv I_1 og I_2 :

$$f = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}$$

der r er avstanden mellom lederne.

Samme retning på strømmene $\Rightarrow$ tiltrekning

Motsatt retning på strømmene $\Rightarrow$ frastøtning

Amperes lov [FGT 30.1, 30.3; YF 29.7, 29.8; AF 26.2; LHL 23.6; G 5.3]

$$\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{l} = \mu_0 I_{\text{in}}$$

for lukket integrasjonskurve som omslutter stasjonær strøm I_{in} . Gjelder for *vilkårlig* lukket kurve og *vilkårlig* strøm I .

Fortegn på strømmen i henhold til høyrehåndsregelen.

Amperes lov *nyttig* når vi har en passende (utnyttbar) symmetri i problemet, slik at integralet på venstre side blir enkelt å løse.

NESTE UKE (uke 16): Mer om eksempler på bruk av Amperes lov. Gauss' lov for magnetfeltet. Oppsummering, elektrostatikk og magnetostatikk.