

## Øving 7

Veiledning: Torsdag 5. oktober  
 Innleveringsfrist: Mandag 9. oktober

### Oppgave 1

En harmonisk transversal bølge med amplitud 5 mm kommer inn fra venstre på en streng med massetetthet 10 g/m. Bølgen blir delvis reflektert og delvis transmittert der strengen er skjøtt sammen med en annen streng med massetetthet 90 g/m.

- a) Hvor store blir amplitudene til reflektert og transmittert bølge?
- b) Hva er midlere effekt transportert med den innkommende bølgen når strengen er strukket med en kraft på 4 N og vinkelfrekvensen er  $10\pi \text{ s}^{-1}$ ? Hvor mye av denne energien blir reflektert og hvor mye blir transmittert?
- c) Anta nå at strengen er spent opp langs  $x$ -aksen, med skjøten mellom den "lette" delen og den "tunge" delen av strengen i  $x = 0$ . Vis at utsvinget på den lette delen ( $x < 0$ ),  $y(x, t) = y_i(x, t) + y_r(x, t)$ , kan uttrykkes som en sum av to stående bølger. Her er  $y_i(x, t) = A \sin(kx - \omega t)$  innkommende bølge (med  $A = 5 \text{ mm}$ ) og  $y_r(x, t) = B \sin(kx + \omega t)$  reflektert bølge.
- d) En stående bølge, f.eks.  $f(x, t) = \sin kx \cos \omega t$ , transporterer ingen netto energi. Kan vi således, i lys av punkt c, konkludere med at bølgen  $y(x, t)$  på den lette delen av strengen ikke transporterer noen netto energi? Skisser  $y(x, t)$  mellom  $x = -2\lambda$  og  $x = 0$  for  $t = 0$ ,  $t = T/4$ ,  $t = T/2$  og  $t = 3T/4$  (der  $\lambda$  er bølgelengden og  $T$  er perioden). Er  $y$  en stående eller en vandrende bølge?
- e) Med skjøten i  $x = 0$  måtte vi velge like fasekonstanter, f.eks.  $\phi_i = \phi_r = 0$  i "delbølgene"

$$y_i(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \phi_i)$$

og

$$y_r(x, t) = B \sin(kx + \omega t + \phi_r)$$

Hvordan vil du velge  $\phi_i$  og  $\phi_r$  med skjøten i  $x = a$ ?

Oppgitt:  $\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$        $v = \sqrt{S/\mu}$        $\overline{P} = \frac{1}{2}v\mu\omega^2y_0^2$

## Oppgave 2

a) Harpestreng nr 16 har en lengde 370 mm og masse 0.2 g. Med strengen festet i begge ender er grunntonen en A med frekvens 440 Hz. Hva er da strammingen i strengen?

- A 41.4 N
- B 57.3 N
- C 63.9 N
- D 72.1 N

b) Hva er laveste resonansfrekvens i et (tynt) luftfyldt rør som er 50 cm langt og åpent i begge ender? Lydhastigheten er 340 m/s.

- A 340 Hz
- B 410 Hz
- C 540 Hz
- D 680 Hz

c) Røret i oppgave b har også en resonansfrekvens lik 1360 Hz. Hvor mange knutepunkter har den tilhørende stående longitudinale utsvingsbølgen  $\xi$  (inne i røret)?

- A 2
- B 3
- C 4
- D 5

d) Bølgene på en vibrerende gitarstreng er opphavet til lydbølger i lufta omkring. Bølgene på gitarstrenge og lydbølgene har samme

- A bølgelengde
- B hastighet
- C amplitude
- D frekvens

Noen svar:

1a: begge er 2.5 mm

1b: 2.5 mJ/s; 25%; 75%